

Z.
DISSE^TRAT^IO IN AVGVRALIS
MEDICO - CHIRVRGICA

DE

INVOLVENDIS
CORPORIS HVMANI
EXTREMITATIBVS

Q V A M

CONSENSV ET AVCTORITATE INCLYTI
MEDICORVM ORDINIS

P R O

GRADV DOCTORIS
MEDICINAE ET CHIRVRGIAE

DIE XXX. SEPT. MDCCXCI


PVBLINE DEFENDET

A V C T O R

A N S E L M V S W O L F F
MOENO - FRANCOFVRTENSIS.



GOTTINGAE,
TYPIS BARM EIERIANIS.



SACRE ROMANI IMPERII

LIBERAЕ

REIPUBLICAE FRANCOFVRTENSIS

SENATVI SPLENDIDISSIMO

V I R I S

GENEROSISSIMIS MAGNIFICIS
EXCELLENTISSIMIS CONSULTISSIMIS

P R A E T O R I S
C O N S U L I B V S
S Y N D I C I S
S E N A T O R I B V S

P A T R I A E P A T R I B V S

OMNI QVA PAR EST REVERENTIA
ET PIETATE

HANC CE

D I S S E R T A T I O I N A V G V R A L E M

D E D I C A T

A V C T O R

A N S E L M V S W O L F F .

C A P V T I.

*Quid sit extremitatum corporis humani
inuolutio; ex quanam materia et
quo modo construenda? —*

§. I.

Sub nomine *inuolutionis extremitatum*
eam intelligo harum partium compressio-
nem leniorem quae nobis verbo
Einwickelung designatur, quaeque, ut
vnum ex efficacissimis Chirurgiae re-
mediis certe accuratiorem meretur con-
siderationem. Ea constat fascia quadam
spirali (*Dolabra sic dicta*) quae a digi-
tis manuum vel pedum incipit, et vs-
que ad ultimum finem superiorem ex-

A tremi-

tremitatum ascendit. Hoc modo eam construere praecipuus mos est; de varietate eius duplici infra loquar (§. 7.).

§. 2.

Inuolutio modo *flanellae*, modo autem *lintei* fasciis, sine certo aliquo indicio sumto construitur. Id tamen sine dubio quibusdam certis indicationibus subiici debet, quas accuratius describendi periculum faciam.

Primo, cum flanellae elasticitas maior sit, eoque etiam illa semper maiorem sese expandendi et contrahendi facultatem habeat, in omnibus casibus eligi debet vbi status extremitatum iste est, vt, inter ipsam inuolutionis applicationem nunc intumescant nunc autem magis collabantur. Tunc enim ob vim suam elasticam flanella cum mutatione partis semper conueniet eoque in altero casu sese magis extendet in altero autem sese contrahet. Linteum contra,
quod

quod minima elasticitate praeditum est, prorsus contrarium effectum hic praestat, dum nec intumescenti cedit partinec collabenti arctius sese applicat. Fuerunt tamen qui ob eandem linteui minorem elasticitatem, praecipue in iis casibus vbi humores quidam (vt sanguis etc.) extrauasantes intumescentiam illam efficiunt, linteum flanellae anteposuerint. Credunt enim linteum extrauasato non cedens eius augmentum, crescentemque ab eo partis tumefacientiam magis inhibere; id quod solummodo speciem prae se fert. Potes enim non minori efficacia, eandem partis tumefacientiam crescentem, flanella prohibere, dummodo eam satis arte applies; nec tunc linteo opus est. Praeterea experientia probatum est, dolores, ex intumescentia partis, ab extrauasato orta vehementiores fieri cum nos intumescentiae magna vi resistamus vt in linteui usu fit, quam tunc cum leniter ei cedamus vt

in flanellae vsu. Semper itaque in hisce casibus flanella linteo anteponenda est. Haec indicatio inter omnes praecipua est, sequentesque, nisi eius habitu respectu, sumi debent. — *Secundum* locum sequens indicatio tenet. Interdum nempe, cum nostra intersit ut pars aegra magis frigida asseruetur, certe linteo vti debemus; in casu contrario autem vbi calor lenis aequalis Chigi consiliis faueat, flanella sumendarur est. — *Tertia* indicatio nos docet interdum statum quendam partium adesse vbi magnam vtilitatem adferre obseruatum sit cum in iis, praeter illos effectus quas sola inuolutia praestat, simul adhuc lenis transpiratio cutanea efficiatur et sustentetur (§. 16 etc.). In quibus omnibus casibus itaque flanella linteo proferri debet. *Quartam* indicationem ex eo sumimus quod inuolutio, ex flanella facta, ob huius rudiorem naturam difficilior disiungitur. Ob hanc causam

gene-

*generatim semper, specialiter autem in omnibus iis praesertim casibus vbi verendum est ne facilius disiungatur, involutio ex flanella facienda est (§. 21 etc.). Tandem autem nonnulli sunt quorum cutis flanellam, quoniam ex lana facta est, tolerare non possit sed prurire incipit, inflammatur, imo excoriatur. Quibus hominibus cum flanella numquam ad cutem nudam applicari possit, haec indicatio prima esse deberet ad quam respiceres, nisi linteo, inter cutem et flanellam posito, omnia verenda prohibere posses. Linteum hoc tamen ita ponendum ne resistat tumefacientiae, sed cedere ei possit. Pro his *generaliter* expositis, indicationes in diversis casibus *specialioribus* facere debemus; id quod infra tentavi. —*

§. 3.

In *applicanda inuolutione* generaliter duae res semper sunt obseruandae; par-

tim ut vbiique aequalis sit pressio ab ea effecta (§. 4 - 5), partim ut vim necessariam eadem habeat (§. 6.).

§. 4.

Vt presio omnibus locis aequalis sit in sequentia animus erigendus est.
1) nempe inuolutio fascia illa spirali quae dolabra media vocatur, facienda est; ea enim prae omnibus caeteris praecipue aequaliter adprimit.
2) Digiⁱt, pro se quisque, inuoluendi sunt paruis fasciis propriis, quarum, in extremis digitis inceptarum et in eorum radice finitarum, relictā pars, in superiorem pedis vel manus partem retorquetur, primoque illius fasciae maioris principio figitur qua caetera inuolutio fit. Quibus fasciis tamen extrema digitorum pars tegi non potest, ita vt sine vlla pressione remaneat; id quod in quibusdam casibus, infra accuratius determinandis, damnā magna afferre potest.

(§. 16.)

(§, 16.). Optime tamen id evitari potest dummodo extrema digitorum parvulo linteo tegantur idque primo fasciae digitorum principio figatur. 3) Facile accidit ut in aequalitatibus extrematum (veluti in articulis) fascia vbiunque simili vi non premat imo locum aliquem ne tangat quidem. Tunc omnia ea incommoda oriri possunt quae ab aliquo loco prorsus non tecto eueniunt (§. seq.). Ea incommoda laminibus linteis quae, inaequalia explentes loca, fasciis subiiciuntur, auertenda sunt.

4. Vbi extremitates formam conicam assumunt fascia reuersa sic dicta applicari debet. Nonnulli, (Gooch etc. *) fasciam reuersam pressionem in aequalem efficere credentes, extrematum formam conicam potius, laminibus linteis adiectis, in formam cylindricam commutare et hisce laminibus tunc fasciam tandem imponere suadent. Sed

A 4

fascia

*) Cases in surgery.

fascia illa reuersa satis aequaliter premit dummodo commode applicata est; in mutanda autem illo modo extremitatum conica forma minus potis sum ut pressionem inaequalem euit.

§. 5.

Vt aequalis vbiique pressio fiat illud etiam cauendum est, ne aliquis locus intectus remaneat. Tum enim ea damna eueniunt ut in hoc loco humores congregantur ita ut tandem exultationem ibi efficiant. Nonnulla in extremitatibus adsunt loca quae difficile teguntur: in inferioribus nempe dorsum pedis et calx. etc. in superioribus cubitus etc. in quibus locis eo dolabrae cruciatae facienda sunt. Attamen saepissime nullo modo quisque tegi potest locus praecipue in calce ubi tunc alia res in auxilium petenda est. Laminibus enim linteis duplicatis ille locus tegitur; quae cum ea longitudine sint

vt

vt fasciae ope arripi possint in illum locum intactum apprimuntur. Lamina illa a nonnullis (THEDEN *) ea longitudine sieri iubentur vt eorum extremae pares fasciis exstent eoque retroflecti et iterum adstringi possint, quo certius in tensione teneantur lamina ipsa; id, quod vix necessarium, praeterea inaequalem pressionem sub fascia efficit. — Interdum fascia optime applicata aliquo casu hic vel illic disiungitur et tunc spaciū intectum relinquit. Cui vt occurratur, necesse est vt hic atque illic (in illis praecipue locis vbi separationis magius periculum adest) inter se coniungatur fascia acu et filo. Et hic flanella iterum preferenda est, quod ob maiorem quam habet asperitatem difficilius loço secedit. Nonnulli, illam disiunctionem tibiali vulgari super inuolutionem induito, prohibere volunt (THEDEN **). Quod tamen non pror-

fus probare possum. Si enim tibiali illud magis amplum est, nil auxilii afferre potest, fin autem arctius (et quidem cl. THEDEN id salis arctum esse postulat *) damnum afferre debet cum applicatione sua fasciam ipsam certissime disiiciat. — Simulac aliquo loco inuolutio cedit vel laxatur statim nouo applicanda est.

§. 6.

Vt pressio quae inuolutione efficitur iustum habeat vim generaliter assumentur illam ita applicandam esse vt diversis fasciae spiris digiti extremum facile subducere possis. Attamen non omni casui ea pressionis vis conuenit; interdum maior (etsi nunquam minor), esse debet; de quo infra prout occasio fert tractabitur.

§. 7.

Nonnulli loco inuolutionis, fascia peractae, tibiale ex pelle canina factum lau-

*) l. e.

laudant (BELL^{*)} WISEMAN^{**) etc.) illique praeferunt. Certissime etiam saepe, (nec tamen semper) id meretur tibiale illud. In illis casibus vbi aegro ipfi applicatio saepius committenda est, et vbi extremitates inter eius applicationem non valde nec celeriter detumescunt (vt hydrops pedum exemplum contrarium praebet) tibiale illud generaliter praeferendum. Singulas casus, infra accuratius distinguam. Certissime, praeterea in vsu facilius et ad aequalem pressionem faciendam magis forsan idoneum videtur. — Preterea alia adhuc adest in inuolutione adplicanda varietas, dum a superiori ac inferiori parte fasciis duabus diuersis simul incipimus; quo efficitur vt in aliquo mediae extremitatis loco (vt in genu etc.). fasciae illae duae obuiam sibi veniunt ibique finiantur et firmantur. Id autem tum}

^{*)} System of London Surgery ou ulvers.

^{**) Several chirurgical treatises fol. London.}

tum tantum fit cum illum locum in quo finiuntur fasciae saepius forsan inspicere debemus; nec tamen concessum est ut quoque tempore tota inuolutio tollatur partim quod difficultati id subiectum est partim quod aliquis effectus malus illic nedundare possit, id quod in vulneribus tendinum in fructura patellae etc. fit (§.). Inuolutio illo modo facta quoque tempore locum affectum inspicere finet nec ut tota in hunc finem tollatur necesse est.

C A P V T II.

De Inuolutionis viribus et usu in genere.

§. 8.

Inuolutionis vires omnes quas in diversis morbis medendis praefstat a sola compressione extremitatum deriuandae sunt. Ea enim *primo* prohibet omnem partium subiectarum contractiōnēm *praeternaturalem* ita ut *musculi* extremitatum, sub inuolutione applicata, inuoluntario et praeternaturali modo sese contrahere non possint. Nec minus, *sola* aliqua *fibra* expansa inuolutione relaxatur. Ab hac vi interdum *secundo* alia quaedam *sopiens* inuolutionis vis proficiscitur ita ut ipsa dolores extremitatum in iis casibus vbi a fibram etc. quadam tensione eueniunt statim

tim tollat (vt in vulneribus partium tendinosarum etc.) — Quae tamen interdum etiam eo forsam prouenit quod inuolutionis pressione nerui, partim (et praecipue quidem) illi qui in cute sunt, partim autem forsan et caeteri, comprimuntur eoque obtunduntur. Id eo etiam confirmatur quod in operationibus, quibus extremitates subiectae sunt, applicata inuolutio dolorem prohibet, minuit. — *Tertio* praeterea prohibet, vasa adferentia leniter comprimendo, adfluxum copiosiorem humorum in extremitates; id quod eam in profluxionibus humorum diuersis, e.g sanguinis, efficacissimum reddit remedium. — *Quarta* alia non minus efficax inuolutionis vis ea est vt compressione illa leniori omnes extremitatis partes praecipue autem cutem, et vasa ab hac per multum dependentia, roboret ita vt in quocumque casu ubi illae partes debilitatae sint magnum auxi-

auxilium afferat. *Quinto* ob has vires ultimo loco nominatas (vid. n. 3 - 4) efficacissimum in morbis remedium omnibus est, vbi accumulatio quaedam in extremitatibus adest; praecipue autem si illa ex solis humoribus constet ut in oedemate pedum (§. 13 etc.). Tunc enim, partim quod, ob vasorum afferentium compressionem, adfluxus humorum minore gradu tantum conceditur, partim quod vasa reuehentia, cute et caeteris omnibus extremitatum partibus, compressione eadem robora-tis, maiorem actionis vim accipiunt praefstant, eoque humorum maior et iustior refluxus fit (§. 13 etc.). In partibus illis, cum debilitatae sint, hoc modo interdum cura radicalis effici potest.

§. 9.

Omnia mala illa in quibus inuolu-tio applicatur aut *totam* extremitatem corripiunt, vt oedema pedum etc.,

(§. 13)

(§. 13 etc.) aut tantum *vnum*, saepe forsan *paruum eius locum* vt e. g. vlcera, aneurismata vera etc, (§. 27 etc.). In hoc casu nonnulli (BELL *) etc.) totius extremitatis compressionem superfluam crediderunt. Volunt contra locum affectum *solum* fascia comprimi (§. 23.). Id autem probare non possum, nam, *primo* omnium horum malorum natura ea est vt generalis extremitatum compressio maiorem fructum in iis adferre debeat (vt in vlceribus oedematosis laxis etc.) (§. 23). *Praeterea* sola compressione locali circulatio semper aliquo modo impeditur, multique mali effectus eo producuntur.

Propria quidem instrumenta inuenta sunt quorum usu compressionem extremitatum localem sine circulationis impedimento fieri posse dicunt (vt ligatura tornatilis Petiti etc.). Eorum instrumentorum applicatio autem cum multa diffi-

difficultate in hisce casibus coniuncta est et praeterea ne semper quidem perfici potest, nec semper effectum laudatum circulationis prorsus librae praestat. Dummodo autem cum locali illa professione, inuolutionem simul coniungamus illam vel magis arctiorem facere possumus, cum inuolutio omnes malos effectus ab impedita circulatione ortas tollat, (§. 8.). imo impeditam circulationem vi sua supra notata quasi restituat. (§. o. Nr. 4-5). — Itaque vbi localis quaedam in extremitatibus compressio necessaria est, ea semper inuolutione facienda et ita quidem ut in locum affectum aliqua res fasciae subiiciatur, vel mollior, vt linteum etc. vel durior vt lignum etc. (§. 27. §. 28.)

C A P V T III.

*De inuolutionis viribus et usu specia-
liter.*

§. II.

Ex his generaliter praemissis luculentius patet cur inuolutio in morbis sequentibus, ad quorum accuratiorem et specialiorem indagationem nunc transire propositum est magnum effectum praestet.

§. I2.

Eius vires in diuersis humorum accumulationibus quibus extremitates saepissime laborant praecipae laudatae sunt. In iis ut supra iam demonstratum est (§. 8. Nro. 4 - 5.) prohibito adfluxu et adsueta secessione humorum prodest. Sed cum accumulationes illae inter se maxime diuersae sint, in quolibet diuerso casu propria nonnulla sunt animadvertenda;

tenda; ob quam causam praecipuos hic perscrutabor.

§. 13.

In omnibus accumulationibus *oedematosis* praecipue in *oedemate pedum* proprie sic dicto magnum auxilium adfert saepissime vel in maiore eiusdam gradu, cum in ascitem etc. iam abiret magna efficacia probata est. Viderunt aegros eodem gradu hydropis laborantes maiore copia vrinam emittere (THEDEN *); imo eiusmodi aegri quibus nullum remedium, et si efficacissimum, auxilium attulerat eodem sere momento quo inuolutio applicabatur per aluum et penem aquam euacuerunt (THEDEN **).

§. 14.

Quidem obseruatum est eam non semper nec vbiique eundem successum felicem in comitatu habere; imo nec minus probatum est eam interdum aquam

B 2

in

*) l. c.

**) l. c.

in pedibus contentam ventri tradidisse
sine ullo effectu salutari. Attamen id nul-
lomodo tollit utilitatem ex eius admini-
stratione petendam, sed potius indica-
tionis, in ea accuratius distinguendae,
nos periculum facere iubet.

§. 15.

In eius usu itaque sequentia praecepta
constitui possunt. *Primo* eius applicatio
eodem momento facienda ubi diuresis
incipit, vel, ubi quidem iam per aliquod
tempus, attamen non satis profusa, fluxit;
eam tunc urinae vel alii missionem auctu-
ram certissimo modo expectare possu-
mus. — *Secundo* ubi omnia et si efficac-
issima remedia adhibita sunt, attamen
nec uniuersâ nec alio aqua abire vult. Tunc
interdum accedit ut remedia illa eodem
momento ubi inuolutio applicatur effe-
ctum producere incipient. *Denique* cum
scarificatione conjuncta; quod praecipue
tunc faciendum cum in praecedente casu
inuo-

lutio nullum effectum praefstat. Cum scarificatione coniuncta enim non solum celeriorem euacuationem aquae adiuvaret sed forsan etiam in prohibendo euentu malo, scarificationem interdum comitante, certius auxilium afferret; quod vtrumque exempla, a suspensorii in scarificatione scroti, imo ab ipfius fasciae Manrojanae in paracenthesis abdominis usitatae, effectu, petita, illustrare videntur: nec non exemplum hydropis articulorum omnium remediorum auxilium deludentis tunc autem compressione topica cum vlcere artificiali coniuncta sanatae *) primum illud ostendit. — Itaque non prossus superfluum mihi videtur quaestio debetne in quolibet pedum oedematosarum scarificatione simul inuolutio administrari? nec minus, fitne vice versa cum inuolutione

B 3 in

*) LÖFFLERS Beyträge zur Arzney-Wissens. und Wundärzneykunst erster Theil. RICHTERS chir. Bibl. 12ter Theil. — 2tes Stück.

in oedemate pedum simplici semper
scarificatio simul conjungenda? —

§. 16.

Praeter hoc oedema proprie sic dictum omnes etiam caeterae accumulationes oedematosae in extremitatibus vel superioribus vel inferioribus maximum et praecipuum auxilium ab inuolutione consequuntur. His in primis eas an numero quae post compressionem vel operationem aneurismatis vel post quamlibet arteriae compressionem in extremitatibus peractam, oriri solent. Hic vasorum minorum vis, ob deficientem trunci primi actionem debilitata, inuolutione roboratur atque subleuatur ita ut omnis accumulatio abeat. (§. 8. Nro. 4 - 5.) In omnibus hisce casibus praecipue autem in praecedente (§. 13 - 15.) nunquam inuolutionem nisi flanella peractam esse debet, quia haec vi sua calefaciente transpirationem efficit (§. 2. Nro. 3.)

Nro. 3.) eoque et per hanc viam illas accumulationes oedematas euacuat. Nec minus praecipue hic extrema digitorum parvulo illo linteo (§. 4.) semper sunt tegenda. —

§. 17.

Quibus in § praecedente transactis accumulationibus aliquo modo etiam adnumerari possunt vlcera pedum illa in quorum curatione inuolutio magni praetii aestimatur, — illa nempe, quorum margines laxos, vasisque varicosis, impletis circumdatos sese proferunt et quae praeterea manifestissimo modo statum debilitatis et relaxationis produnt. Ea enim vlcera quorum perduratio saepissime tantum ab imperfecta circulatione in extremitatibus, nec minus a debilitate cutis topica et ab adfluxu humorum, illuc ire longe iam assueto, pendet, sola praecipue sunt quibus inuolutio destinata est. Ea enim omnes vires proprias ad

illum statum tollendum necessarias se-
cum coniungit. Roborat enim cutem at-
que vasa debilitata (§. 8. n. 4.), auget
circulationem tardatam (§. 8. n. 4.) mi-
nuitque adfluxum humorum ad ulceram
suetum, nec experientia iterata nisi effi-
cacissimum id remedium sese ostendit.

§. 18.

Attamen sunt obseruatores qui cum
efficacia inuolutionis in ulceribus minime
contenti ei contra obiiciant: vim eius
non solum saepe prorsus cessasse sed
etiam etsi forsan in principio cum suc-
cessu applicata esset, tamen postea no-
vam exulcerationem sanati iam ulceris
admisisse; imo ei obiecerunt cum pe-
simo effectu ipsam applicatam esse ita ut
aliis corporis locis nobilioribus, vt sunt
caput et pectus etc., periculofissima sym-
ptomata ab ea producerentur. At om-
nes obiectiones illae ab intempestiuā
facta applicatione ortae videntur iisque
for

forsan melius occurri potest cum sequentibus praeceptis obediemus (§. 19.). Partim enim inuolutio in iis vlceribus quibus aliquis character specificus inesse supponendus (vt arthriticus, scabiosus etc.) nunquam applicanda est, nisi antea remediis necessariis destructus sit; quibus neglectis character ille specificus ex vlcere in alias partes emittitur. Minor in hoc praécepto obseruando, cautioni, praecipui ex illis malis effectibus adscribendi sunt *). Nec minus partim exsiccatio vlceris, inuolutione magis praecipitata saepissime malos effectus produxit; sicuti quique ceteri, et si minimi, effluxus, quibus naturam quasi assueta est multos et vel acutissimos euentus producere potest cum aliquo modo magis subitaneo exsicetur. Hisce malis euentibus tamen occurri potest certa atque secura via dummodo efflu-

*) RICHTER Aufangs - Gründe der Wundak, 1^o Band.

xum ex vlcere prodeuntem sensim sensimque cessare curemus. Effluxus ille eo tantum modo diminui debet quo vlceris circumferentia minuitur eaque, simulac magis celeriorem effluxus cessationem intelligimus vnguentum irritans, ex praecipitato rubro, applicatum adulcus cum inuolutione coniungendum est. Inter hanc vlcerum tractationem ab Cel. VNDERWOOD *) per viginti annos secutam is nunquam aliquem malum effectum productum vidit.

§. 20.

Quod ad illas obiectiones attinet inuolutionem saepissime nullum effectum praestitisse (§. 18.) partim non postulandum vt remedium, et si efficacissimum, nunquam in applicatione cesseret; nec itaque inuolutioni cessatio virtutis interdum obseruata pro crimine habenda; imo caeteris obseruationibus contra fulientes

eam
*) A treatise on ulcers of the Legs by M. VNDERWOOD London 1783.

eam maximo iure inter efficacissima remedia numerare possumus. Forsan etiam illi obseruatores indicationes non satis distinxerunt, inuolutionemque in casibus administarunt in quibus pro obseruationibus reiteratis non magnum auxilium, imo fere nullum affert; quorum nonnulli in §. 22. nominati sunt.

§. 21.

Denique recrudescentia vlcerum, inuolutione iam sanatarum, de qua nonnulli queruntur (§. 18.) tunc forsan potissimum euitanda est si cum inuolutione motionem corporis coniungamus. Nam certum mihi videtur quod inter quietem cutis et muscularum totius extremitatis sanatum sit libenter sese aperitum fore simulac ex hac maxima quiete statim motui exponitur. Itaque numquam vel tantummodo paucis exceptis casibus medici iudicio relinquendis inuolutio ad sananda vlcera inter quietem applicanda est.

est, sed contra cum motu corporis semper coniungi debet. Nec necessaria est quies in ulceribus sanandis ea enim sola numquam aliquod ibi praestitit sine situ horizontali; imo sane hoc remedtum es- set maxime detrimento sum, cum circu- latio, quae turbata in hisce morbis saepe causa summi potest (§. 17.) illa quiete adhuc magis lenta redditur. In administranda autem inuolutione ea pror- fusi carere possumus quod inuolutio si- tum horizontali, quocum quies semper coniuncta esse debet, superfluum facit; nam, aegro etsi in motu corporis ver- sante, tamen easdem vires exercet ob quas situs horizontalis efficaciam praesti- tit; hic enim nil aliud efficit quam ut re- fluxui humorum ex extremitate faueat; idem, imo forsan modo magis perfecto, inuolutio facit etsi stante ac mouente aegro; qua itaque applicata nec situi horizontali nec quiete cum hoc insepa- rabiliter coniuncta opus erit; inter mo- tum

tum contra extremitatum sanatio ulceris perfici potest quod tunc, ut iam supra dixi, difficilius recrudescat, eoque pars querelarum iniustarum disinebit. Nec id, cui ut credo veritatis species non abnuenda sola speculatione theorethica euolutum, sed potius experientia iam probatum est. UNDERWOOD *) enim per viginti annos apud aegros suos involutionem semper cum motu coniunxit eoque id effecit ut nunquam ulcera iterum recrudescerent.

In hoc casu tamen ubi cum involuendis pedibus motus corporis coniunctus est inuolutio flanella vel tibiali ex pelle canina facta (§. 7.) perfici debet quia aliter ipsa disiungitur eaque aegro in mouendo corpore impedimento est.

§. 22.

Inuolutio non solum in illis ulceribus laxis et varicofis (§. 17.) sed etiam in

*) l. c.

in inflammatis commendata est (VNDERWOOD *). Sed viri experimentissimi (RICHTER **), BELL ***, THEDEN †), id dissuadent. Sint tamen forsan casus quidam ulcerum inflammatorum in quibus eam adhibere non vetandum est, cum experientia edocet simus eam in vulneribus inflammationem et dolorem saepius tollere (THEDEN ‡). Attamen sine ullo dubio in ulceribus *callosis* inflammatis vetanda nam hic certissime pressione sua callositatem, inflammationem doloremque auget.

§. 23.

In ulceribus dolorificis phagae denen-
cis sine inflammatione et callositate ma-
ximum subitaneum effectum praestat in-
volutio THEDEN ††).

§. 24.

*) l. c.

**) l. c.

***) l. c.

†) l. c.

††) l. c.

†††) l. c.

§. 24.

BELL, pressionem vlceris topicam sufficere contendens inuolutio-
nem, si status vlceris oedematosus
in loco vlceris tantum inueniatur nec
in totam extremitatem sese extendat
non maiorem facere suadet quam vt
nonnullarum digitarum latitudine super
et infra vlcus procedat. Sine vlo du-
bio concedendum est, compressionem
topicam et sufficere hic ad sanationem
posse; id demonstrant obseruationes il-
iae vlcerum in alia parte corporis sola
pressione sanatorum (BELL *). Imo
Bromfield, teste VNDERWOODIO, hac
topica pressione vel Bubones malignos
sanauit. Attamen etsi pro hisce obser-
vationibus tota inuolutio ad sanationem
vlcerum non semper necessaria, tamen
prout hoc loco praecipue multo effica-
tior nunquam illi negligenda est (vid.
§. 10. n. 2.).

§. 25.

* I. c. on vlcers.

§. 25.

In varicibus inuolutio magni pretii est. Ea hoc loco *partim* applicatur sine anteacta apertione et euacuatione varicum ad resoluendum sanguinem in iis contentum; id quod semper faciendum cum varices adhuc recentes sint. *Partim* autem applicatur anteacta aper-
tione et euacuatione sanguinis, quod fit cum varices iam vetustiores sanguinem crassum tenent et induratum: euacuato
tunc sanguine, vena, inuolutione com-
pressa, nouam impletionem non sinet sed
forsan tota destruitur. Attamen et in
his casibus semper primo cum inuolu-
tione periculum faciendum est, quod et
ibi totam curam ab ea peractam vide-
runt (RICHTER *). Interdum autem
denique inuolutione hic in eum finem uti-
muri ut magnos varices, visi eorum aper-
tionem fuscipere volimus ea sustineamus
ne forsitan se se ipsos aperiant. Atta-
men

*) l. c.

men curam hanc palliatiuam, post aliquod tempus semper fere relinquere et varicem tamen aperire cogimur. In varicibus inuolutio, ex pelle canina facta, praecipue commendanda est (RICHTER *).

§. 26.

Eadem in *contusionibus* atque *sugillationibus* optimum remedium est, dum vasis tonum restituit (§. 8. n. 4. 5.) humorumque absorbtionem efficit. Ultimum quod praecipue mirandum est in aneurismate spurio; ibi saepissime magnae sanguinis aceruatae moles ea resoluentur. Attamen interdum in iis locis vbi magis induratae sunt sanguinis massae, eas relinquit, quae tunc cultro excindi debent. —

§. 27.

Aneurisma verum saepe curari sola topica compressione obseruationibus eui-

ctum

*) l. c.

Etum est (GVATTANI *). Attamen et hic cum topica compressione semper tota extremitatis inuolutio coniungi debet, eo modo qui supra descriptus est (§. 10. n. 2.). Id ob eam praecipui fieri debet causam, quod hic semper fere ob impeditam circulationem tumor extremitatum oedematosus adest, isque illa compressione topica non tollitur, imo certissime augetur.

Hoc autem tum praecipue fit cum, ut nonnulli suadent, (GVATTANI ** THEDEN ***) et magna vtilitate reuera fieri potest, arteriae tractum totum supra tumorem aneurismaticum puluillo adiecto comprimimus. Tunc praecipue totius extremitatis inuolutio nunquam negligenda est. Eodem modo sese res habet cum aneurismate *spurio* circumscripto, cumque *varice aneurismatico* quem tamen raro curationi submittere necesse est. —

§. 28.

*) De aneurismatibus 4. 1778.

**) l. c.

***) l. c.

§. 28.

Et in tumoribus durioribus, ut tumoribus cysticis, resoluendis pressio continua, quae ibi saepissime auxilium praestitit (RICHTER *) ob rationes supra iam notatas inuolutione facienda est si in extremitatibus tumores illi sita sunt. Vel durissimi tumores cystici, nempe ganglia, ea resoluta sunt (THEDEN **). RICHTER ***). Si Ganglion recens adhuc est cura saepe breui tempore absolvitur. sin autem iam vetustum longiore; eiusmodi Ganglion vel post hebdomada tredecim interruptae applicationis inuolutione tandem sanatum est (THEDEN †). Cujus curae longa duratio culterum semper anteponere inuolutioni suadere videtur nisi forsan aegri timor vel alia quaedam causa improvisa inuolutionem sumere suadent. Hic in ganglionis casu praecipue res duriores inuulutione subiiciendae sunt, quo-

C 2 ma-

*) l. c.

**) l. c.

***) l. c.

†) l. c.

magis ganglion comprimeretnr. Praeterea in casu vetusto resolutio ganglii valde promouetur si ceratum ex oxi- crato factum simul subiicitur fasciae (THEDEN *).

§. 29.

Inuolutionis efficacia in tumoribus resoluteudis demonstrata, ad eam nunc me vertam quam vel in prohibendo, praeternaturali ex extremitatibus efflu- xu aliquo, vel etiam in tollenda ali- qua secretione cutis peruersa, praestat. Hoc in herpetibus etc., illud in sanguini- nis profusione locum habet.

§. - 30.

In *herpetibus* enim (§. praec.) interdum vtilitate fuit sed caueas ne sine maxima circumspectione eam applies! Acutissimos enim effectus ab ea in hoc casu productos vidi, quod etiam valde cum re conuenit cum hic inuolutio sola fere ut remedium exsiccans vel efflu-

xum

*) l. c.

xum solitum prohibens agat (§. 19. n. 1.) et praeterēa materiam morbosam specificam corpori tradat (§. 19. 2.). —

§. 31.

In sanguinis profusione nimia efficax remedium est; hoc loco praesertim cum compressione topica vel ligatura arteriarum coniungitur id quod tunc efficit ut illae securiores sint. Attamen et sola sua vi profusionem sanguinis tollere potis est. In vtroque casu autem id faciendum ut fascia multo strictius adiaceat quam supra commendatum est. (§. 6.)

§. 32.

Quod ad illam vim attinet quam in tollendo operationum quarundam dolore habet, nos ea raro vti posse credo, quia tum semper fere impedimento operationi esse debet; Praecipue in iis operationibus nunquam adhiberi potest vbi, quod saepius fit, in iis sus-

eipendiſ ignōramus quanta incisio facienda sit. In panaritio ante omnia praecipue commendata (THEDEN^{*}) ad leniendum maximum acerbissimumque dolorem qui cum illius apertione coniunctus est. Attamen eius applicatio in hoc malo semper fere dolorem multo maiorem efficiet quam cum aperitione fine ea suscepta coniunctus erit. Si eam instituamus arctior applicari debet.

§. 33.

Adhuc mihi restat magnum et quidem ultimum inuolutionis effectum explicare, quem nempe in tollenda vel musculi cuiusdam totius vel fibrae singulae tensione et contractione, praefstat (§. 8. n. 2.)

§. 34.

Eius efficacia in tollendis singulorum fibrarum tensionibus praecipue luculentiter demonstrata est in vulneribus tendinum incompletis qualia praecipue in

ven-

*) l. c.

venefectionibus infelibus (THEDEN*) in rupturis tendinum ut tendinis achillis etc. obseruatur. Hic acerbissimos usque ad conuulsiones auctos dolores vix applicata tollit. (THEDEN **).

§. 35.

Eius efficacia in prohibenda nimia et praeternaturali contractione musculorum (§. 31) praecipue etiam in vulneribus muscularum et tendinum et in fracturis ossium, ac quidem praecipue eorum obseruata quorum fractae partes muscularum actione inter se amouentur; exempla sint patellae et ossis calcarei fractura. Hic enim inuolutio dum musculos praeternaliter contractos, compressione sua expandere sese cogit, fractarum partium superficies appropinquatur et optimo successu concrescit. Eadem sese res habet cum superficie extremorum tendinis percisssi. Hic praeterea si tendo maior

C 4

et

*) l. c.

**) l. c.

et crassior est (vt e. g. tendo achillis) simul affluxum succi tendinos, interdum ibi tanta copia obseruatum vt aegrum abriperet *) tollere potest. — forsitan etiam callum ossium et tendinum luxuriantem non sinet; partim pressione sua teniori in locum affectum, partim dum maiorem humorum affluxum ad eum locum prohibet (§. 8.)

§. 36.

In omnibus hisce casibus modo illo ad §. 7. descripto perficienda est inuolutio; ita etiam in fractura patellae (RICHTER **) et intendinum nuptura (WARDENBURG ***) commendatum est. Interdum autem hic in prima applicazione partes diuisae eo modo sepe sibi appropinquare non possunt ut statim in contactum veniant; tunc quoque die renouan-

*) commercium litterar. Norimbergense. L. I. 1731.

**) chir. Bibl.

***) Ueber den Verband getrennter Achillisfchnen.

nouanda est inuolutio usquedum tandem sensim sensimque locum suum teneant partes diuisae; id quod numquam fallit (RICHTER etc.). Inuolutioni in curanda tendinis Achillis nuptura obiectum est: eam illius partes diuisas adprimere ad subiectum os et telam cellulosam quibuscum tunc concrescere posset (DE-SAVLT *) id quod DESAVLT euitare docuit dum linteo carpto fossas laterales apud tendinem explet eoque modo tendinem prohibet quominus retropremi possit **).

*) Jurnal de chirurgie.

**) I. c.

THESES.

- I. Grauiditas nunquam usum vomitorii,
caute dati, contra indicat.
- II. Peripneumonia post anginam non
metastasis est, sed huius morbi ef-
fectus.
- III. Melius est, prolem lactari a matre,
quam a nutrice.
- IV. Dysenteria est Rheumatimus inte-
stinorum.

V. *Vera suppuratio vix oritur, nisi praegressa inflammatione.*

VI. *Haemorrhoides nec sunt laudandas nec plane reiiciendae.*

VII. *Pus prima sua principia ex lympha coagulabili ducere existimo.*

VIII. *Febris puerperarum fere semper ex sordibus primarum viarum oriri videtur.*

IX. *Nulla, nisi quae tactu percipiuntur, grauiditatis signa, praecipue in primis mensibus satis certa sunt.*

X. *Sublata Causa semper cessat effectus.*

XI. *Diaphoretica nisi simul sint antispasmodica prodeesse nequeunt, imo nocent.*

XII. *Sumus gradus inflammationis est initium putredinis.*

XIII. *Nulla febris sine materia.*

XIV. *Crusta pleuritica febris inflammatione non est causa, sed potius effectus.*
